


Baycox®



2,5%

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Πόσιμο διάλυμα



Πόσιμο διάλυμα για ορνίθια
κρεοπαγωγής και ινδορνίθια

85950169

**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germany
Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

Φλεμινγκ 15

15123 Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: +30 2106800900

Fax: +30 2106833488

E-mail: info@hellafarm.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:

ACTIVET LTD

Αντρέα Μισούλη 50

2415 Εγκωμη, Λευκωσία

Τηλ.: 00357 22591918

Fax: 00357 22591917

E-mail: info.activet@cytanet.com.cy

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΥΣΟΧ® 2,5% πόσιμο διάλυμα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Δραστικό συστατικό:

Toltrazuril (τολτραζουρίλη) 25 mg/ml

Έκδοχα:

Trolamine, Polyglycol P 200

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη θεραπεία της κοκκιδίωσης που προκαλείται από διάφορα
είδη κοκκιδίων της *Eimeria*:

Κρεοπαγωγά ορνίθια: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E.*
mitis, *E. necatrix* και *E. tenella*.

Ινδορνίθια: *E. adenoides* και *E. meleagrimitis*.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται στις ωοπαραγωγές όρνιθες.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Καμία

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικούς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Ορνίθια κρεοπαγωγής και ινδορνίθια

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ)
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Χορηγείται με το πόσιμο νερό.

Συνιστάται η θεραπεία με Baycox® 2,5% σε δύο συνεχόμενες
ημέρες σε δόση:

α) 25 ppm τολτραζουρίλης (1 ml Baycox® 2,5% ανά λίτρο πόσιμου
νερού) αν η θεραπεία είναι συνεχόμενη (24 ώρες το
εικοσιτετράωρο) ή εναλλακτικά

β) 75 ppm τολτραζουρίλης (3 ml Baycox® 2,5% ανά λίτρο πόσιμου
νερού) αν η θεραπεία περιορίζεται στις 8 ώρες την ημέρα.

Η συνολική δόση (βάσει της ηλικίας του πτηνού και τη διαχείριση
της μονάδας), δε θα πρέπει να είναι λιγότερη από 7 mg/kg σ.β./
ημέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σε συγκεντρώσεις μικρότερες του 1ml Baycox® 2,5% ανά λίτρο
πόσιμου νερού, μπορεί να προκληθεί ίζημα. Συνιστάται να
παρασκευάζεται καθημερινά, φρέσκο διάλυμα νερού με
Baycox® 2,5%.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων
προσθετικών στο πόσιμο νερό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: Ινδορνίθες: 16 ημέρες

Ορνίθια κρεοπαγωγής: 14 ημέρες

Να μη χορηγείται σε πτηνά τα αυγά των οποίων προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό, προστατευμένο από το
φως.

Φυλάσσεται μακριά από τις ζωοτροφές και τα παιδιά.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη:

12 εβδομάδες

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΣ)

Το Baycox® 2,5% είναι αλκαλικό. Να πλένονται αμέσως τα μάτια
και τα χέρια με νερό σε περίπτωση που έλθουν σε επαφή με το
προϊόν. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού ή
ποτού κατά τη χρήση του προϊόντος.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των
χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην
προστασία του περιβάλλοντος.

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί με φιαλίδιο των 50 ml και 100 ml

Φιάλη των 1000 ml

Κάνιστρο των 5 L

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.A.K. στην Ελλάδα: 25784/18-04-2006/K-0050701

A.A.K. στην Κύπρο: 16134

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό
φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον
τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

***Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793777**

Bayer