

# Baytril®



## 2,5%

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Πόσιμο διάλυμα

### 100 ml



Πόσιμο διάλυμα για μόσχους

856691538

#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το 1 ml διαλύματος περιέχει:

#### Δραστικό συστατικό:

Enrofloxacin 25 mg

Έκδοχα: Potassium hydroxide 100%,

Benzyl alcohol, Hypromellose,

Water purified

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χάρτινο κουτί με πλαστική φιάλη των 100 ml

Χάρτινο κουτί με πλαστική φιάλη

των 500 ml



## Bayer



Πλαστικός περιέκτης των 5 L  
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι  
συσκευασίες.

#### **ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Το BAYTRIL oral solution 2,5% περιέχει  
ενροφλοξακίνη, που είναι ευρέος  
φάσματος αντιμικροβιακό και συνιστάται  
για τη θεραπεία των πρωτογενών  
βακτηριακών νόσων του αναπνευστικού  
και του πεπτικού συστήματος, αλλά  
και των δευτερογενών λοιμώξεων  
έπειτα από ιώσεις των μόσχων, που  
προκαλούνται από ευαίσθητα στην  
ενροφλοξακίνη μυκοπλάσματα, Gram  
θετικά και αρνητικά βακτήρια, όπως

*Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Pasteurella*  
spp., *Haemophilus* spp., *Bordetella* spp.,  
*Mycoplasma* spp., *Streptococcus* spp. και  
*Staphylococcus* spp.

Έτσι το BAYTRIL oral solution 2,5% είναι  
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στους μη  
απογαλακτισθέντες μόσχους για τη θεραπεία  
της παστερέλωσης, της βρογχοπνευμονίας,  
της νόσου της μεταφοράς, της  
μυκοπλάσμωσης, της κολιβακίλλωσης, της  
κολισηψαιμίας και της σαλμονέλλωσης.

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

##### Τρόπος χορήγησης

Χορηγείται από το στόμα, είτε απευθείας είτε  
με το πόσιμο νερό.

#### Δοσολογία και διάρκεια θεραπείας

Η γενική δοσολογία για τους μόσχους είναι 5 ml BAYTRIL oral solution 2,5%/50 kg σ.β. (που αντιστοιχεί σε 2,5 mg ενροφλοξακίνης/kg σ.β.) για 3 συνεχόμενες ημέρες. Σε περιπτώσεις επιπλεγμένων αναπνευστικών νοσημάτων και σαλμονέλλωσης, η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί σε 10 ml BAYTRIL oral solution 2,5%/50 kg σ.β. Σε περίπτωση σαλμονέλλωσης η θεραπεία διαρκεί 5 συνεχόμενες ημέρες.

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 10 ημέρες

**ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)**

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση.

#### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φώς και την υγρασία. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες

Διάρκεια ζωής του προϊόντος αναμιγμένο με το πόσιμο νερό: 2 ημέρες

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

**Αποκλειστικά για κτηνιατρική  
χρήση - να διατίθεται μόνον με  
κτηνιατρική συνταγή  
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ  
ΟΠΟΙΑ**

**ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  
+30 210 7793 777**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

**BAYER ANIMAL HEALTH GmbH**  
51368, Leverkusen, Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

**ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ**

Τηλ.: 0030 2106800900-9

Fax: 0030 2106833488

E-mail: info@hellafarm.gr

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:  
1242/10-01-2011/Κ-0051703

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:  
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

# Baytril®



## 2,5%

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Πόσιμο διάλυμα

### 100 ml



Πόσιμο διάλυμα για μόσχους

85691538

#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το 1 ml διαλύματος περιέχει:

#### Δραστικό συστατικό:

Enrofloxacin 25 mg

**Έκδοχα:** Potassium hydroxide 100%,

Benzyl alcohol, Hypromellose,

Water purified

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χάρτινο κουτί με πλαστική φιάλη των 100 ml

Χάρτινο κουτί με πλαστική φιάλη

των 500 ml



## Bayer

