



Bolfo® collar

Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο προποξούρης για σκύλους και γάτες

Εναντίον των ψύλλων και των κροτώνων
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen, Germany

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Φλέμγκ 15
151 23 Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6800900-9
Fax: +30 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:

ACTIVET LTD

Αντρέα Μιαούλη 50
2415 Εγκωμη, Λευκωσία
Τηλ.: 00357 22591918
Fax: 00357 22591917
E-mail: info.activet@cytanet.com.cy

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
BOLFO® collar

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ανά περιλαίμιο:

Δραστικό συστατικό:

2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate 4,442 g
(μεγάλο περιλαίμιο)

85715070

2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate 1,234 g
(μικρό περιλαίμιο)

Έκδοχα:

Di-n-butyl-adipate, Propylene glycol dicaprylocaprate, Epoxidized soybean oil, Stearic acid, Pigment mixture*, Polyvinylchloride

*The pigment mixture has the following composition:

Titanium dioxide, Iron oxide yellow, Iron oxide red, Iron oxide black

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση παρασιτώσεων στα ζώα από ψύλλους και κρότωνες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενή και εξασθενημένα ζώα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ειδικά τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του περιλαίμιου, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ερεθισμός στο δέρμα/κνησμός σε υπερευαίσθητα ζώα.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος, Γάτα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ένα περιλαίμιο για κάθε ζώο

Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευασία από το περιλαίμιο, ξεδιπλώστε και αφαιρέστε τις πλαστικές ταινίες από το εσωτερικό του περιλαίμιου.

Εφαρμόστε το περιλαίμιο χαλαρά, γύρω από το λαιμό του ζώου και προσσαρμόστε το τραβώντας την περίσσεια από το κούμπωμα.

Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν το δέρμα στην περιοχή του περιλαίμιου κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών, για να βεβαιωθούν ότι το περιλαίμιο δεν είναι σφικτό (θα πρέπει να διατηρείται απόσταση περίπου δύο δακτύλων μεταξύ του λαιμού και του περιλαίμιου).

Το περιλαίμιο θα πρέπει να φοριέται συνεχώς.

Διάρκεια προστασίας κατά των ψύλλων:

μέχρι 4 μήνες

Διάρκεια προστασίας κατά των κροτώνων:

μέχρι 10 εβδομάδες

Όταν η αποτελεσματικότητα μειωθεί, εφαρμόστε νέο περιλαίμιο.

Η δράση κατά των ψύλλων αρχίζει εντός λίγων ωρών. Οι κρότωνες φονεύονται έπειτα από μία ημέρα. Απομακρύνονται εύκολα ή αποπίπτουν.

Το περιλαίμιο είναι αποτελεσματικό είτε το ζώο κινείται ή αναπαύεται. Η διάρκεια της προστασίας εξαρτάται από το μήκος και την κατάσταση του τριχώματος, τη δραστηριότητα του ζώου και το επίπεδο της παρασίτωσης.

Μολονότι το περιλαίμιο BOLFO είναι υδατοστεγές, συνιστάται η αφαίρεσή του κατά τη διάρκεια του λουτρού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Μόνο για εξωτερική χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Να διατηρείται κλειστό μέχρι τη χρήση.

Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου:

Το περιβάλλον του ζώου αποτελεί μία ανεξάντλητη πηγή για την εμφάνιση παρασιτώσεων από ψύλλους, και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται επαρκώς και παράλληλα με τα ζώα, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερα το επιθυμητό αποτέλεσμα στα ζώα.

Οι ψύλλοι είναι οι ενδιάμεσοι ξενιστές ταινιών των σκύλων και των γατών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει η θεραπεία κατά των ψύλλων να συνδυάζεται με ανθελμινθική θεραπεία.

Γενικές προφυλάξεις:

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με τα ζώα που φορούν το περιλαίμιο.

Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.

Μην παίζετε με το περιλαίμιο, ιδιαίτερα τα παιδιά.

Μη γλείφετε ή μασάτε το περιλαίμιο, ιδιαίτερα τα παιδιά.

Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Μην πίνετε, τρώτε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Αυτό το προϊόν περιέχει καρβαμιδική ένωση. Σε περίπτωση τοξικών συμπτωμάτων να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Μόνο για εξωτερική χρήση.

Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια με σαπούνι και νερό μετά το χειρισμό του περιλαίμιου.

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό προποξούρη ή σε κάποιο από τα έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Άλλες προφυλάξεις:

Αυτό το προϊόν είναι υψηλά τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, τα πτηνά και τις μέλισσες. Μην επιτρέπετε σε σκύλους που φορούν το περιλαίμιο να κολυμπούν σε υδροφόρο ορίζοντα που περιέχει υδρόβιους οργανισμούς.

Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τον περιέκτη. Καταστρέψτε ή απορρίψτε τους κενούς περιέκτες σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία:

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στα ζώα άλλα παρασιτοκτόνα.

Υπερδοσολογία:

Λόγω της φύσης του προϊόντος, δεν εμφανίζονται συμπτώματα υπερδοσίας. Σε περίπτωση κατάποσης λόγω ατυχήματος, μπορεί να παρατηρηθούν συμπτώματα δυσφορίας και δηλητηρίασης, όπως υπερβολική σιελόρροια, μύση, έμετος ή διάρροια. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό.

Αντίδοτο: Θεϊκή ατροπίνη

Ασυμβατότητες:

Δεν είναι γνωστή καμία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μη μολύνετε ποτάμια, δεξαμενές, υδροφόρους ορίζοντες, φράγματα και άλλες πηγές νερού με το προϊόν.

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμμάτα του ή κενοί περιέκτες πρέπει να απορρίπτονται ασφαλώς σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελλάδα: 26/02/2016

Κύπρος: 15/02/2016

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί με ένα περιλαίμιο για μικρόσωμους σκύλους και γάτες μήκους 380 ± 38,0 mm σε foil

Κουτί με ένα περιλαίμιο για μεγαλόσωμους σκύλους μήκους 700 ± 70,0 mm σε foil

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

A.A.K. στην Ελλάδα: 752/09-01-2013/K-0007604

A.A.K. στην Κύπρο: 17910

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

***Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ
ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
+30 210 7793777**

**ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ**

Bayer