

# Droncit®

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



### ΔΙΣΚΙΑ

**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

**Bayer Animal Health GmbH**  
D-51368, Leverkusen, Germany

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

**KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH**  
Projensdorfer Str. 324  
D-24106 Kiel  
Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος :

**ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ**

Φλέμιγκ 15,

15123, Μαρούσι, Αττική

Τηλ.: +30 2106800900

Fax: +30 2106833488

E-mail: info@hellafarm.gr

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Κάθε δισκίο περιέχει:

**Δραστικό συστατικό:**

Praziquantel 50 mg

**Έκδοχα:**

Lactose monohydrate  
Microcrystalline cellulose  
Polyvinylpyrrolidone 25  
Sodium lauryl sulfate  
Magnesium stearate  
Silicon dioxide colloidal  
Maize starch

**ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Ενδείκνυται για την καταπολέμηση των σπουδαιότερων κεστώδων που είναι υπεύθυνα για τις παρασιτικές ζωονοσολογικές και τα οποία συγχρόνως προκαλούν την ταινίαση των σαρκοφάγων, όπως *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Mesocostoides corti*, *Diphylobothrium (Spirometra) erinacei* και *Taenia multiceps*.

Επίσης, συνιστάται για την καταπολέμηση των υπόλοιπων ταινίασεων των σαρκοφάγων που οφείλονται στα είδη *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaformis* και *Joyeuxiella pasqualei*.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Δεν έχουν αναφερθεί.

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Δεν υπάρχουν, εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Τα περιθώρια ασφαλείας του προϊόντος είναι τόσο μεγάλα, που είναι δύσκολο να προσδιορισθεί η LD<sub>50</sub> στους σκύλους και τις γάτες. Μπορεί να χορηγηθεί σε εγκυμονούντα ζώα χωρίς καμία επίπτωση στο έμβρυο. Το DRONCIT γίνεται καλά ανεκτό και δε χρειάζεται να προηγηθεί δίαιτα πριν από τη χορήγησή του.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

**ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Σκύλος, Γάτα

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ)**

**ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Χορηγείται εφάπαξ από το στόμα. Η γενική συνιστώμενη δόση ανέρχεται σε 5 mg ανά kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχεί σε ένα δισκίο ανά 10 kg σ.β.

**Σκύλος**

Μέχρι 2,5 kg: 1/4 του δισκίου

2,6-5 kg: 1/2 δισκίο

6-10 kg: 1 δισκίο

11-20 kg: 2 δισκία

21-30 kg: 3 δισκία

**Γάτα**

Μικρά γατάκια: 1/4 του δισκίου

Ενήλικες γάτες: 1/2 δισκίο

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Χορηγείται από το στόμα.

Τα δισκία DRONCIT χορηγούνται αυτούσια ή μέσα σε τεμάχιο κρέατος ή ακόμη και αλεσμένα με την τροφή.

**ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Δεν απαιτείται.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

**ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Καμία

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

17/05/2013

**ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Χάρτινο κουτί με 50 δισκία (5x10) σε blister

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 38996/17-05-2013/Κ-0023301

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

**\*Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή\*  
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ  
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΩΝ: +30 210 7793777**

**PROVET**  
ANIMAL HEALTH CARE

**Bayer**

85953931