

Welpan®



**Πόσιμο εναιώρημα κατά των νηματωδών
παρασίτων**

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen, Germany

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel, Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Φλέμγκ 15
151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2106800900
Fax: +30 2106833488
E-mail: info@hellafarm.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:

ACTIVET LTD
Αντρέα Μισούλη 50
2415 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ.: 00357 22591918
Fax: 00357 22591917
E-mail: info.activet@cytanet.com.cy

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

ΟΣΥΣΙΣ

Το 1 ml εναιωρήματος περιέχει:

Δραστικά συστατικά:

Pyrantel pamoate 14,4 mg
Febantel 15,0 mg

Έκδοχα: Sodium propionate, Sodium benzoate, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Sorbitan monooleate, Polyvidone, Polysorbate 80, Docusate sodium, Bentonite, Citric acid anhydrous, Cochineal red EG-Nr 124 Cl 75470, Xanthan gum, Propylene glycol, Water purified

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το WELPAN® ενδείκνυται για τη θεραπεία από νηματώδη παράσιτα σε κουτάβια και νεαρούς σκύλους, όπως:

Ασκαρίδες: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*

Αγκυλοστόματα: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*

Άλλα νηματώδη: *Trichuris vulpis*

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με συστατικά που περιέχουν πιπεραζίνη.

Να μη χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικούς τον κτηνιάτρο σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Κουτάβια και νεαροί σκύλοι

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ)
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Δοσολογία και θεραπευτικό σχήμα

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 15 mg φαιβαντέλης και 14,4 mg πυραντέλης παμοΐκής/ kg σωματικού βάρους. Αυτό αντιστοιχεί σε 1 ml εναιωρήματος ανά kg σωματικού βάρους.

Επειδή οι παρασιτώσεις από ασκαρίδες συμβαίνουν στους σκύλους σε πολύ μικρή ηλικία (ενδομητρική και δια του θηλασμού μετάδοσης), η θεραπεία με WELPAN® πρέπει να αρχίσει περίπου στην ηλικία των δύο εβδομάδων και να επαναλαμβάνεται κάθε δύο εβδομάδες μέχρι την ηλικία των 12 εβδομάδων.

Τρόπος χορήγησης

Χορηγείται από το στόμα.

Το εναιώρημα μπορεί να χορηγηθεί απευθείας από το στόμα ή να αναμιχθεί με την τροφή. Δεν απαιτούνται διαιτητικά μέτρα. Ανακινήστε καλά πριν από τη χορήγηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 10 εβδομάδες

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Καμία

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Να πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Συμβουλευθείτε τον κτηνιάτρο σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

Ελλάδα: 24/04/2009

Κύπρος: 22/09/2014

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί με φιαλίδιο των 50 ml και δοσομετρητή των 5 ml

Κουτί με φιαλίδιο των 50 ml και αντλία

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

A.A.K στην Ελλάδα: 30088/24-04-2009/K-0117501

A.A.K στην Κύπρο: 18773

***Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 210 7793777**

Bayer

85953850